

## Ergänzung zu G. Czwalina's Sammelbericht

(in der Deutschen Entomologischen Zeitschrift XXIX, pag. 251)

von

Prof. Dr. *Lentz* in Königsberg i. Pr.

---

Der Sammelbericht von G. Czwalina (a. a. O.) mag hier vervollständigt werden, indem ich die außerdem aus Preußen seit 1879 hinzugekommenen Coleopteren angebe, Unrichtigkeiten und Irrthümer meines 1879 erschienenen Catalogs beseitige und neue Fundorte seltener Käfer bezeichne.

Auf pag. 2 ist einzuschalten: *Dyschirius impunctipennis* Daws., bei Kulm von Helm gef.

p. 4. Ob *Agonum dolens* Sahlb. und *triste* Dej. synonym sind, wie in Cat. Ed. III angegeben, steht noch dahin. Seidl. Fn. Balt. p. 17, 18 hält sie auseinander: von *triste* ist *teste* Czw. 1 St. bei Danzig von Helm gef., auf welches die Angaben von Seidl. gut zutreffen.

*Feronia dimidiata* Ol. ist schon von Illiger, Mag. I, 166 *teste* Hellwig aus Pr. angeführt.

p. 5. *Amara livida* F. (*bifrons* Gyll.) besitze ich 3 St. vom Seestrande.

p. 8. *Dytiscus* (richtig ist *Dyticus*, *δντιξός*) *latissimus* L. wird von Hrn. v. Mülverstedt bei Rosenberg in Menge gef. Sehr richtig ist, was C. A. Dohrn in Stett. Ent. Zt. 1882, 471 über die gelbgefärbten tiefen Furchen der Fld. beim ♀ sagt. Bei einem meiner Stücke zeigen aber nicht nur die Furchen 2, 3, 4 rothgelbe Farbe, sondern alle von 1 bis 7. Auch das Scutellum hat eine gelbe Spitze, und bei meinem ♂ hat dasselbe eine breitgelbe Peripherie an der Seite bis zum Apex.

p. 9. *Hydrobius fuscipes* L. var. *Rottenbergi* (Schles. Ztchr. für Ent. Heft III, 1872) hat bei Danzig Helm am Seestrande gef. [v. Heyden det.] <sup>1)</sup>

*Helophorus laticollis* Thoms. und *strigifrons* Thoms., beide in Mergelkaulen mehrfach von Kuwert bei Wernsdorf gef.

---

<sup>1)</sup> Die Namen der Bestimmer sind in [ ] gesetzt; Epp. ist = Eppelsheim, Czw. = Czwalina.

p. 10. *Bolitochara lucida* Grav. 1 St. von mir in einem Blätterpilz im Langen Walde bei Germau gef.

*Ischnoglossa proluxa* Grav., *rufopicea* Kr. Dz. (Helm) [Epp. det.].

p. 11. *Aleochara latipalpis* Rey. 1 St. in Gelgühen bei Allenstein von mir gef. [Epp. det.].

*Atemeles emarginatus* Grav., var. *nigricollis* Kr., bei Oliva Juli 85 von Cz. gefangen.

p. 12. *Homalota (Notothecta) confusa* Märk. 3 St. von Lopennehen in der Elditt'schen Sammlung.

*Hom. (Pycnota) cribrata* Kr. 2 St. Schrombehnen. Cz., [Epp. det.].

*Hom. (Plataraea) hepatica* Er. Kbg. Cz. [Epp. det.].

p. 13. *Hom. (Traumoecia) picipes* Thoms. Schrombehnen. Cz. [det. Scriba.].

*Hom. (Aleuonota) rufotestacea* Kr., bei Gelgühen von mir gef. [Epp. det.].

p. 14. *Hypocyrtus discoideus* Er. Danz. Helm.

p. 15. *Quedius vexans* Epp. Dtsch. Ent. Ztschr. 1881, 297. Gilgenb. Kramer, Danz. Helm.

*Qu. brevicornis* Thoms. Dz. Helm [Epp. det.].

*Qu. tristis* Grav. Dz. Helm [Epp. det.].

p. 16. *Staphylinus (Ocytus) falcifer* Nordm. 1 St. Kuwert. Wernsd. [Czwal. det.].

*Philonthus concinnus* Grav., *varians* Thoms. II, 159, 16, von mir 3 St. bei Kbg. gef. [Epp. det.] (Früher zu *ebeninus* Grav. gezogen.)

*Ph. lucens* Er. wird aus Lyck von Sanio angegeben.

*Ph. (Gabrius) exiguus* Nordm. Kramer, bei Gilgenburg.

p. 17. *Leptacinus parumpunctatus* Gyll., bei Kbg. von mir gef.

*Lathrobium laevipenne* Heer. Dz. Helm [Epp. det.].

*Achenium humile* Nicol. 2 St. Wernsd. Kuwert.

p. 18. *Dianous coeruleus* Gyll., einmal in Mehrzahl von Steiner bei Landsberg unter den Steinen einer Freischleuse, auch in einem Waldbach gef.

*Stenus pusillus* Steph. aus Konitz von Sieb. angegeben.

*St. unicolor* Er., von mir bei Kbg. gef. [Epp. det.].

*Bledius bicornis* Germ. Dz. Helm [Epp. det.].

*Bl. cribricollis* Heer; ebenso.

*Bl. unicornis* Germ. 1 St. ♀ bei Cranz von mir gef.

p. 19. *Anthophagus alpinus* Pk. 2 St. ♀. Dz. Helm [Czw. det.].  
*A. caraboides* L., *testaceus* Germ., von mir in Spittelpark von Linden herabgeklopft.

*A. abbreviatus* F., *caraboides* Er., im feuchten Laubwalde, häufig.

p. 22. *Catops flavicornis* Thoms. IX, 346. 1 St. Stoppel-Bündken. [Czw. det.]

*Colon dentipes* Sahlb., var. *Barnevillei* Kr. Kbg. Czw.

p. 25. *Saprinus lautus* Er., bei Kulm von Helm gef.

p. 26. *Eपुरaea longula* Er. bei Kbg. 1 St. von mir, ein zweites von Czaplewski gef.

p. 28. Von dem hier sehr seltenen *Pediacus depressus* kenne ich nur zwei pr. St., eines unter Birkenrinde auf der Westerplatte bei Dz. von Helm gef., das zweite im Wohnzimmer von Künow in's offene Fenster geflogen.

*Monotoma scabra* Kunze scheint nicht synonym mit *picipes* Hbst., namentlich unterschieden durch die dick vortretenden Vorderwinkel des Halssch. und die stark gezähnelten Seiten desselben. Redt., Fn. Austr. 2, p. 378. Seidl., Fn. Balt., p. 165. In Catal. Ed. III sind sie verbunden. — Ueber *Mon. spinicollis* Aub. sind die Angaben sehr von einander abweichend: cf. Reitter, Schles. Ins. 1877, Heft VI, p. 5, mit Seidl., Fn. Balt., p. 168. Eins meiner St. zeigt deutlich, das von Rtr. angegebene Merkmal: *frons lateribus prope antennarum basin acute angulata*.

*Cryptophagus quercinus* Kr. ist zu streichen: die Bestimmung war falsch (*affinis* St.).

p. 30. *Corticaria longicornis* Hbst., var. *badia* Mannh., von mir bei Kbg. gef.

*Dermestes undulatus* Brahm von Dz. durch Sieb. angegeben.

p. 31. *Elmis (Esolus) pygmaeus* Müll. Dz. Helm.

*Heterocerus fossor* Ksw. 1 St. ebenso. [Czw. det.]

p. 32. *Aphodius porcus* F. nach Illig., K. Pr. p. 31, 22, in Süd-Preußen (Kug. Manusc. 6, 18); bisher nicht wiedergef. Freilich bezeichnete in der damaligen Zeit der Name Süd-Preußen einen Theil Polens.

p. 33. *Trox cadaverinus* Ill. wurde im Sommer 1800 zweimal bei Osterode gef. (Kug. in Ill. Magaz. I, 44.)

*Oxyomus sus* Hbst., zuerst bei Elbing gef. (l. c. I, 28.)

p. 35. *Agrius coeruleus* Rossi, bei Dammhof gef. von Sauter.  
*Adelocera punctata* Hbst., *atomaria* F., einmal bei Kreuzburg gef. (L. Meier, teste Elditt im 7. Berichte des Faunaverains p. 34.)

p. 36. *Diacanthus cinctus* Pk., aus Dz. von Siebold angezeigt.

p. 37. *Cyphon nitidulus* Thoms., bei Heiligenbeil von Czw. gef.  
 p. 38. *Charopus pallipes* Oliv. ist zu streichen; häufig ist bei  
 uns *Ch. flavipes* Pk., *pallipes* Er.

*Dasytes coeruleus* Dej. ist zuerst 1795 auf *Onopordon acanthium*  
 gef. (Kug. bei Illiger, K. Pr. p. 309.)

*Danacaea pallipes* Pz., einmal in altem Holze gef. (Kug. bei  
 Ill., Magaz. I, 83, *Melyris*), aber nicht wieder.

p. 39. *Ptinus dubius* St. 1 St. bei Aweiden gef. Böttcher.

p. 40. *Dorcatoma subglobosa* Muls. 1 St. Juli 85 bei Conrads-  
 hammer von Czw. gef. — Ebenso wie Gredler eine merkwürdige  
 var. von *D. bovistae* von Bozen erwähnt (Erichson, K. D. V, p. 164  
 als var. *castaneae*), habe auch ich eine ähnliche var. von *subglobosa*  
 aus Gbg. durch Kramer erhalten, nämlich mit rothen, hinten etwas  
 geschwärtzten Fld. und mit gelblichem Zwischenraum der Seiten-  
 randstreifen.

*Ennearthron laricinum* Mell., von mir in einem Baumschwamm  
 in der Brandenburger Haide gef.

p. 41. *Helops (Nalassus) quisquilius* F., von dem ich 3 St. aus  
 Lyck und 2 St. aus Neust.-Ebw. besitze, ist sicher der von Ill., K. Pr.  
 p. 120, erwähnte *dermestoides*. In Cat. Ed. III wird nun der *der-*  
*mestoides* Ill. mit *quisquilius* F. zu *Fabricii* Gemm. gezogen, während  
 Ill. selbst, der den Käfer offenbar vor Augen gehabt hat, ihn mit  
*caraboides* Pz. verbindet; ihm folgt Seidl., Fn. Balt. p. 365.

p. 45. *Strophosomus curvipes* Thoms., von Buchen geklopft.  
 Dz. Helm.

Von *Sitones flavescens* Marsh., 8-*punctatus* Fahrs. besitze ich  
 kein sicheres pr. Stück, dagegen *S. puncticolis* Steph., *flavescens*  
 Thoms. ist hier häufig.

*Sit. cambricus* Steph., neuerlich bei Kulm (Parowe) gef. Helm.

p. 46. *Cneorhinus albicans* Boh. wird von Zebe als bei Dz.  
 vorkommend angegeben (Redt., Fn. Austr. 2, p. 698), ist aber sicher  
 nicht pr., sondern auf ganz weisse, bei Dz. nicht seltene St. des  
*geminatus* zu beziehen: so in Dommer's Sammlung.

p. 47. Von *Erirehinus bimaculatus*, var. *Frivaldskyi* Tourn., be-  
 sitze ich ein ausgezeichnetes St. von Dammhof.

*Dorytomus punctator* Hbst., unter welchem Namen in der  
 Elditt'schen Sammlung sich 2 St. befinden, bezeichnet: „*Borussia*  
*Koltze*“, ist von Faust p. 154 mit *agnathus* Boh. vereinigt: häufig  
 im botan. Garten auf Weidengesträuch; darunter die var. *clitel-*  
*larius* Boh. (oben abgerieben).

p. 48. *Anthonomus varians* Pk. Von der ganz schwarzen var. *ater* Marsh. (von *rubi* Hbst. durch bedeutendere Größe und glänzenden Rüssel unterschieden) = *perforator* Hbst. habe ich 3 St. bei Metgethen von Nadelholz geklopft.

p. 49. *Gymnetron melanarium* Germ., einige St. Oliva. Czw. *Miarus longirostris* Gyll. ist zu streichen.

p. 50. *Ceuthorhynchus boraginis* F. ist zu streichen, verwechselt mit dem hier häufigen *boraginis* Gyll. = *quadridens* Pz.

*C. spinosus* Goeze, *horridus* Pz. Albrechtsthal bei Wehlau (Sauter), Dirschau (Czw.), Danzig (Helm).

p. 53. *Bruchus affinis* Fröl., *flavimanus* Boh. 2 St. bei Landsberg (Steiner).

p. 54. *Dryocoetus alni* Georg., Stett. Ent. Zt. 1856, p. 59, habe ich 1 St. von Gelgühen. [Epp. det.]

p. 55. *Pogonocherus bidentatus* Thoms. 2 St. von Ludwigsort.

p. 56. *Stenostola ferrea* Schrk., *nigripes* F. verzeichnet Sieb. aus Kgb., und ist im Juni und Juli 85 mehrfach bei Löwenhagen (Kuwert) und bei Warnicken (Brinkmann und Hallensleben) gef.

p. 57. Von *Lema cyanella* L. ist die seltene schwarze Var. von Grabowski bei Eichen gef. Mai 80.

p. 58. *Cryptocephalus laevicollis* Gebl. Horst am Pregel (Kuwert). 1 St.

p. 61. *Haltica (Aphthona) Erichsoni* Zett. (auch die Hinterchenkel roth) habe ich 1 St. aus Ggbg.

p. 62. *Adonia mutabilis* Scrib. ist aus Versehen ausgelassen, ich besitze 3 St. von Kgb.